

Réserve ornithologique du Teich – *Le Teich bird reserve*

Dernier comptage des principales espèces – *The most recent counts of the main species*

MARS 2017

| DATE | 10/03 | 27/03 | COMMENTAIRE |
|---|-------|-------|--|
| Cygne tuberculé <i>Mute Swan</i> | 15 | 15 | Plusieurs nids occupés |
| Oie cendrée <i>Greylag Goose</i> | 21 | 20 | Très discrètes, nids en cours |
| Tadorne de Belon <i>Shelduck</i> | 229 | 168 | Visites des sites de nids |
| Canard siffleur <i>Wigeon</i> | 7 | | |
| Canard chipeau <i>Gadwall</i> | 5 | 2 | Couple fidèle au site |
| Sarcelle d'hiver <i>Common Teal</i> | 312 | 134 | Plusieurs couples possiblement cantonnés |
| Sarcelle d'été <i>Garganey</i> | 1 | 4 | 1ère le 10 |
| Canard colvert <i>Mallard</i> | 78 | 56 | Femelles couvent discrètement |
| Canard pilet <i>Pintail</i> | 150 | 65 | |
| Canard souchet <i>Shoveler</i> | 365 | 532 | Belle escale migratoire |
| Fuligule milouin <i>Common Pochard</i> | 2 | 1 | |
| Fuligule morillon <i>Tufted Duck</i> | 1 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Grèbe castagneux <i>Little Grebe</i> | 13 | 2 | |
| Grèbe huppé <i>Great crested Grebe</i> | 3 | 4 | |
| Grèbe à cou noir <i>Black-necked Grebe</i> | | | |
| Grèbe esclavon <i>Slavonian Grebe</i> | 1 | 1 | Espèce rare |
| Grand Cormoran <i>Cormorant</i> | | 35 | Dortoir |
| Bihoreau gris <i>Night Heron</i> | 7 | | |
| Héron garde-boeufs <i>Cattle Egret</i> | | 1 | Dortoir |
| Aigrette garzette <i>Little Egret</i> | | 23 | Dortoir |
| Grande Aigrette <i>Great Egret</i> | | 19 | Dortoir |
| Héron cendré <i>Grey Heron</i> | | 5 | Non compté |
| Cigogne blanche <i>White Stork</i> | 11 | 11 | 5 nids à priori |
| Spatule blanche <i>Spoonbill</i> | 64 | 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Milan noir <i>Black Kite</i> | 10-12 | 40-50 | 1er le 18/02. Effectif au complet le 27 |
| Busard des roseaux <i>Marsh Harrier</i> | 2-4 | 2-3 | Parades nuptiales sur le delta (2cples potentiels) |
| Busard St Martin <i>Northern Harrier</i> | | | |
| Epervier d'Europe <i>Eurasian Sparrowhawk</i> | 2 | 2 | |
| Buse variable <i>Common Buzzard</i> | 2 | 1 | |
| Balbusard pêcheur <i>Western Osprey</i> | | | |
| Faucon hobereau <i>Eurasian Hobby</i> | | | |
| Faucon pèlerin <i>Peregrine Falcon</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Râle d'eau <i>Water Rail</i> | ±35 | ±35 | |
| Gallinule poule d'eau <i>Common Moorhen</i> | ±70 | ±70 | |
| Foulque macroule <i>Eurasian Coot</i> | 173 | 64 | 1 nid en construction au 7 |
| Grue cendrée <i>Common Crane</i> | | | Derniers vols le 03 mars |

| Date | 10/03 | 27/03 | |
|--|-------|-------|---------------------------------------|
| Avocette élégante <i>Pied Avocet</i> | 315 | 6 | 3 couples, prospections sur les sites |
| Petit Gravelot <i>Little Ringed Plover</i> | 1 | 4 | 1er le 06/03 |
| Grand Gravelot <i>Common Ringed Plover</i> | 261 | 114 | |
| Pluvier argenté <i>Grey Plover</i> | 4 | 12 | |
| Vanneau huppé <i>Northern Lapwing</i> | | | |
| Echasse blanche <i>Black Winged stilt</i> | 1 | 13 | 1ère le 09 |
| Bécasseau maubèche <i>Red Knot</i> | | | |
| Bécasseau minute <i>Little Stint</i> | 11 | 28 | |
| Bécasseau de Temminck <i>Temminck's Stint</i> | | | |
| Bécasseau cocorli <i>Curlew Sandpiper</i> | | | |
| Bécasseau variable <i>Dunlin</i> | 3598 | 2299 | |
| Combattant varié <i>Ruff</i> | | | |
| Bécassine des marais <i>Common Snipe</i> | 21 | 10 | |
| Barge à queue noire <i>Black-tailed Godwit</i> | 645 | 322 | Gros départs vers l'Islande |
| Barge rousse <i>Bar-tailed Godwit</i> | 8 | | 42 le 29 |
| Courlis corlieu <i>Whimbrel</i> | | | |
| Courlis cendré <i>Eurasian Curlew</i> | 665 | 646 | |
| Chevalier arlequin <i>Spotted Redshank</i> | | 6 | |
| Chevalier gambette <i>Common Redshank</i> | 32 | 24 | |
| Chevalier aboyeur <i>Common Greenshank</i> | | | |
| Chevalier culblanc <i>Green Sandpiper</i> | | 1 | |
| Chevalier sylvain <i>Wood Sandpiper</i> | | | |
| Chevalier guignette <i>Common Sandpiper</i> | | | |
| Tournepiere à collier <i>Ruddy Turnstone</i> | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| Mouette rieuse <i>Black-headed Gull</i> | ±20 | ±50 | Arrivée sur les nids le 09 |
| Mouette pygmée <i>Little Gull</i> | | | |
| Mouette mélanocéphale <i>Mediterranean Gull</i> | | 10 | 1 ou 2 couples formés |
| Goéland cendré <i>Mew Gull</i> | 1 | | |
| Goéland marin <i>Great Black-backed Gull</i> | 2 | 2 | Couple en attente |
| Goéland leucopnée <i>Yellow-legged Gull</i> | 3 | 2 | Couple en attente |
| Goéland argenté <i>European Herring Gull</i> | | | |
| Goéland brun <i>Lesser Black-backed Gull</i> | | | |
| Sterne caugek <i>Sandwich Tern</i> | | | |
| Sterne pierregarin <i>Common Tern</i> | | | |
| Guifette moustac <i>Whiskered Tern</i> | | | |
| Guifette noire <i>Black Tern</i> | | | |
| | | | |
| Martin pêcheur d'Europe <i>Common Kingfisher</i> | 3 | | |
| Huppe fasciée <i>Eurasian Hoopoe</i> | 1 | 1 | 1ère le 06 |
| Torcol fourmilier <i>Eurasian Wryneck</i> | | 2 | |
| Bergeronnette printanière <i>Yellow Wagtail</i> | | 5-8 | Premiers couples cantonnés |
| Gorgebleue à miroir blanc <i>Atlantic Bluethroat</i> | 1 | 9 | 9 mâles chanteurs au minimum |