

Réserve ornithologique du Teich – *Le Teich bird reserve*

Dernier comptage des principales espèces – *The most recent counts of the main species*

MAI 2018

| | DATE | 04/05 | 17/05 | COMMENTAIRE |
|---|------|-------|-------|--|
| Cygne tuberculé <i>Mute Swan</i> | | 22 | 23 | 4 familles x9 x9 x7 x9 +1 nid |
| Oie cendrée <i>Greylag Goose</i> | | 13 | 13 | 3 familles x5 x4 x3 |
| Tadorne de Belon <i>Shelduck</i> | | 110 | 196 | 2 familles x6 x5 |
| Canard siffleur <i>Wigeon</i> | | 1 | 1 | |
| Canard chipeau <i>Gadwall</i> | | 3 | 3 | Nids possibles |
| Sarcelle d'hiver <i>Common Teal</i> | | 3 | 1 | Nids possibles |
| Sarcelle d'été <i>Garganey</i> | | | | |
| Canard colvert <i>Mallard</i> | | 88 | 120 | Au minimum 17 familles |
| Canard pilet <i>Pintail</i> | | | | |
| Canard souchet <i>Shoveler</i> | | 7 | 1 | Nids possibles |
| Fuligule milouin <i>Common Pochard</i> | | | | |
| Fuligule morillon <i>Tufted Duck</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Grèbe castagneux <i>Little Grebe</i> | | 2 | 1 | Couple tardif, nidification possible |
| Grèbe huppé <i>Great crested Grebe</i> | | 2 | 2 | 1 nid |
| Grèbe à cou noir <i>Black-necked Grebe</i> | | | | |
| | | | | |
| Grand Cormoran <i>Cormorant</i> | | | 1 | Dortoir |
| Bihoreau gris <i>Night Heron</i> | | | | |
| Héron garde-boeufs <i>Cattle Egret</i> | | | | |
| Aigrette garzette <i>Little Egret</i> | | 59 | 48 | Dortoir |
| Grande Aigrette <i>Great Egret</i> | | | | |
| Héron cendré <i>Grey Heron</i> | | 3 | | |
| Cigogne blanche <i>White Stork</i> | | 6 | | 3 nids |
| Spatule blanche <i>Spoonbill</i> | | 20 | 7 | |
| Ibis falcinelle <i>Glossy Ibis</i> | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Milan noir <i>Black Kite</i> | | ±15 | ±15 | Forte baisse, mais présents |
| Busard des roseaux <i>Marsh Harrier</i> | | | 1 | Rares incursions des nicheurs proches. |
| Busard St Martin <i>Northern Harrier</i> | | | | |
| Epervier d'Europe <i>Eurasian Sparrowhawk</i> | | | | |
| Buse variable <i>Common Buzzard</i> | | | | |
| Balbusard pêcheur <i>Western Osprey</i> | | | | |
| Faucon hobereau <i>Eurasian Hobby</i> | | 1 | 2 | En chasse matin et soir |
| Faucon pèlerin <i>Peregrine Falcon</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Râle d'eau <i>Water Rail</i> | | ±35 | ±35 | |
| Gallinule poule d'eau <i>Common Moorhen</i> | | ±70 | ±70 | 2 familles au moins. |
| Foulque macroule <i>Eurasian Coot</i> | | 2 | 30 | Arrivée des hivernantes le 15 mai |
| Grue cendrée <i>Common Crane</i> | | | | |
| | | | | |

| Date | | | |
|--|------|------|---|
| Avocette élégante <i>Pied Avocet</i> | 6 | 4 | Nids détruits par le blaireau le 13 mai |
| Petit Gravelot <i>Little Ringed Plover</i> | | | |
| Grand Gravelot <i>Common Ringed Plover</i> | | 121 | |
| Pluvier argenté <i>Grey Plover</i> | 301 | 106 | Le 17, majorité de non nicheurs |
| Vanneau huppé <i>Northern Lapwing</i> | | | |
| Echasse blanche <i>Black Winged stilt</i> | 11 | 8 | Nids détruits par le blaireau le 13 mai |
| Bécasseau maubèche <i>Red Knot</i> | 87 | 1036 | Escale record ! |
| Bécasseau minute <i>Little Stint</i> | | 5 | |
| Bécasseau de Temminck <i>Temminck's Stint</i> | | | |
| Bécasseau cocorli <i>Curlew Sandpiper</i> | 4 | | |
| Bécasseau variable <i>Dunlin</i> | 900 | 482 | |
| Combattant varié <i>Ruff</i> | 3 | 2 | |
| Bécassine des marais <i>Common Snipe</i> | | | |
| Barge à queue noire <i>Black-tailed Godwit</i> | | 1 | |
| Barge rousse <i>Bar-tailed Godwit</i> | 213 | 65 | Le 17, majorité de non nicheurs |
| Courlis corlieu <i>Whimbrel</i> | 1 | 29 | |
| Courlis cendré <i>Eurasian Curlew</i> | 4 | 41 | |
| Chevalier arlequin <i>Spotted Redshank</i> | 8 | | |
| Chevalier gambette <i>Common Redshank</i> | 319 | 603 | |
| Chevalier aboyeur <i>Common Greenshank</i> | 49 | 24 | |
| Chevalier culblanc <i>Green Sandpiper</i> | | | |
| Chevalier sylvain <i>Wood Sandpiper</i> | | | |
| Chevalier guignette <i>Common Sandpiper</i> | 6 | 4 | |
| Tournepierre à collier <i>Ruddy Turnstone</i> | 4 | 7 | |
| | | | |
| | | | |
| Mouette rieuse <i>Black-headed Gull</i> | ±150 | ±50 | Nids détruits par le blaireau le 13 mai |
| Mouette pygmée <i>Little Gull</i> | | | |
| Mouette mélanocéphale <i>Mediterranean Gull</i> | | | |
| Goéland cendré <i>Mew Gull</i> | | | |
| Goéland marin <i>Great Black-backed Gull</i> | 4 | 2 | 1 nid |
| Goéland leucopnée <i>Yellow-legged Gull</i> | 4 | 4 | 1 nid |
| Goéland argenté <i>European Herring Gull</i> | 5 | | |
| Goéland brun <i>Lesser Black-backed Gull</i> | | | |
| Sterne caugek <i>Sandwich Tern</i> | | | |
| Sterne pierregarin <i>Common Tern</i> | | | |
| Guifette moustac <i>Whiskered Tern</i> | | | |
| Guifette noire <i>Black Tern</i> | | | |
| | | | |
| Martin pêcheur d'Europe <i>Common Kingfisher</i> | | | |
| Huppe fasciée <i>Eurasian Hoopoe</i> | | | |
| Torcol fourmilier <i>Eurasian Wryneck</i> | | | Migrateurs en escale certains jours |
| Bergeronnette printanière <i>Yellow Wagtail</i> | ±15 | ±15 | Peu de cantons |
| Gorgebleue à miroir blanc <i>Atlantic Bluethroat</i> | ±8 | ±8 | Nourrissages + 2e ponte en perspective |