

Réserve ornithologique du Teich – *Le Teich bird reserve*

Dernier comptage des principales espèces – *The most recent counts of the main species*

JUIN 2019

| DATE | 04/06 | 21/06 | COMMENTAIRE |
|---|-------|-------|---|
| Cygne tuberculé <i>Mute Swan</i> | 17 | 15 | 3 nichées |
| Oie cendrée <i>Greylag Goose</i> | 2 | 21 | Les 22 autres très discrètes... 1 nichée de 3 |
| Tadorne de Belon <i>Shelduck</i> | 145 | 135 | Seulement 4 nichées ! |
| Canard siffleur <i>Wigeon</i> | | | |
| Canard chipeau <i>Gadwall</i> | | 1 | |
| Sarcelle d'hiver <i>Common Teal</i> | 4 | 8 | |
| Sarcelle d'été <i>Garganey</i> | | | |
| Canard colvert <i>Mallard</i> | 307 | 303 | 30 Nichées pour l'instant |
| Canard pilet <i>Pintail</i> | | | |
| Canard souchet <i>Shoveler</i> | 3 | 2 | |
| Fuligule milouin <i>Common Pochard</i> | | | |
| Fuligule morillon <i>Tufted Duck</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Grèbe castagneux <i>Little Grebe</i> | | | |
| Grèbe huppé <i>Great crested Grebe</i> | 4 | 3 | 1 nid au 15 |
| Grèbe à cou noir <i>Black-necked Grebe</i> | | | |
| | | | |
| Grand Cormoran <i>Cormorant</i> | 1 | 4 | Dortoir |
| Bihoreau gris <i>Night Heron</i> | | 1 | |
| Héron garde-boeufs <i>Cattle Egret</i> | | | |
| Aigrette garzette <i>Little Egret</i> | 34 | 52 | Dortoir |
| Grande Aigrette <i>Great Egret</i> | | | |
| Héron cendré <i>Grey Heron</i> | 3 | 3 | |
| Cigogne blanche <i>White Stork</i> | 3 | 1 | Pas de reproduction cette année |
| Spatule blanche <i>Spoonbill</i> | ? | 14 | |
| | | | |
| | | | |
| Milan noir <i>Black Kite</i> | ±20 | ±30 | Reproduction très moyenne à priori |
| Busard des roseaux <i>Marsh Harrier</i> | 1 | 1 | Le mâle passe de temps en temps |
| Busard St Martin <i>Northern Harrier</i> | | | |
| Epervier d'Europe <i>Eurasian Sparrowhawk</i> | | | |
| Buse variable <i>Common Buzzard</i> | | | |
| Balbuzard pêcheur <i>Western Osprey</i> | | | |
| Faucon hobereau <i>Eurasian Hobby</i> | | | |
| Faucon pèlerin <i>Peregrine Falcon</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Râle d'eau <i>Water Rail</i> | ±35 | ±35 | 1 famille au plus |
| Gallinule poule d'eau <i>Common Moorhen</i> | ±70 | ±70 | |
| Foulque macroule <i>Eurasian Coot</i> | 195 | 293 | Arrivée massive de migratrice précoces |
| Grue cendrée <i>Common Crane</i> | | | |
| | | | |

| Date | | | |
|--|------|------|---|
| Avocette élégante <i>Pied Avocet</i> | 20 | 9 | |
| Petit Gravelot <i>Little Ringed Plover</i> | 2 | | |
| Grand Gravelot <i>Common Ringed Plover</i> | 67 | | Fin du passage de printemps |
| Pluvier argenté <i>Grey Plover</i> | 113 | 53 | Fin du passage de printemps |
| Vanneau huppé <i>Northern Lapwing</i> | | 4 | Premiers migrateurs d'automne |
| Echasse blanche <i>Black Winged stilt</i> | 39 | 7 | |
| Bécasseau maubèche <i>Red Knot</i> | 17 | | |
| Bécasseau minute <i>Little Stint</i> | | | |
| Bécasseau de Temminck <i>Temminck's Stint</i> | | | |
| Bécasseau cocorli <i>Curlew Sandpiper</i> | | | |
| Bécasseau variable <i>Dunlin</i> | 105 | 23 | Fin du passage de printemps |
| Combattant varié <i>Ruff</i> | | | |
| Bécassine des marais <i>Common Snipe</i> | | | |
| Barge à queue noire <i>Black-tailed Godwit</i> | 94 | 119 | Arrivée de migrants hollandais |
| Barge rousse <i>Bar-tailed Godwit</i> | 11 | 17 | |
| Courlis corlieu <i>Whimbrel</i> | 38 | 66 | |
| Courlis cendré <i>Eurasian Curlew</i> | 135 | 218 | Arrivée des femelles de l'Est de l'Europe |
| Chevalier arlequin <i>Spotted Redshank</i> | | 4 | Migration d'automne lancée |
| Chevalier gambette <i>Common Redshank</i> | 114 | 124 | Migration d'automne lancée |
| Chevalier aboyeur <i>Common Greenshank</i> | 2 | | |
| Chevalier culblanc <i>Green Sandpiper</i> | | 4 | Migration d'automne lancée |
| Chevalier sylvain <i>Wood Sandpiper</i> | | | |
| Chevalier guignette <i>Common Sandpiper</i> | | 1 | |
| Tournepierre à collier <i>Ruddy Turnstone</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mouette rieuse <i>Black-headed Gull</i> | ±150 | ±150 | 18 nids occupés |
| Mouette pygmée <i>Little Gull</i> | 1 | | |
| Mouette mélanocéphale <i>Mediterranean Gull</i> | | | |
| Goéland cendré <i>Mew Gull</i> | | | |
| Goéland marin <i>Great Black-backed Gull</i> | | | |
| Goéland leucopnée <i>Yellow-legged Gull</i> | 30 | 1 | 2 à 3 couples sans reproduction |
| Goéland argenté <i>European Herring Gull</i> | | | |
| Goéland brun <i>Lesser Black-backed Gull</i> | | | |
| Sterne caugek <i>Sandwich Tern</i> | 30 | 11 | |
| Sterne pierregarin <i>Common Tern</i> | | | |
| Guifette moustac <i>Whiskered Tern</i> | | | |
| Guifette noire <i>Black Tern</i> | | | |
| Sterne élégante <i>Elegant Tern</i> | 1 | | 1ère obs. sur réserve !! s'accouple avec caugek |
| Martin pêcheur d'Europe <i>Common Kingfisher</i> | | 1 | 1er retour |
| Huppe fasciée <i>Eurasian Hoopoe</i> | | | |
| Torcol fourmilier <i>Eurasian Wryneck</i> | 1 | | Nourrissage vers toilettes |
| Bergeronnette printanière <i>Yellow Wagtail</i> | ±30 | ±30 | Plusieurs familles |
| Gorgebleue à miroir blanc <i>Atlantic Bluethroat</i> | ±20 | ±30 | Nourrissages + secondes pontes |