


Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Plus petit de nos canards de surface, la Sarcelle d'hiver est un oiseau au plumage subtil. Le mâle porte un masque vert de l'œil à l'arrière du cou, ses flancs sont décorés de fines vermiculations sombres. La femelle est plus discrète : sa tête, son bec et son corps sont bruns. Tous deux arborent un miroir vert irisé.

Sur la Réserve : d'août à avril



Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Plus grand de tous les grèbes, le Grèbe huppé est peu farouche. Bon nageur, il est capable de rester sous l'eau plusieurs minutes et peut plonger jusqu'à 20 mètres. Son bec rose et noir est long et pointu. Sa huppe sombre s'accompagne au printemps d'une collerette de plumes rousses et noires.

Sur la Réserve : d'août à mars

Observer
les oiseaux

de la Réserve Ornithologique du Teich

mes observations

#orniteich

Le / /

J'ai observé espèces différentes !

Mon observation préférée aujourd'hui :

.....
.....

Autres espèces observées :

.....
.....
.....
.....



Aigrette garzette

Egretta garzetta

Petit échassier, l'Aigrette garzette arbore un plumage blanc immaculé et un bec noir en forme de dague. En plumage nuptial, deux longues plumes viennent orner l'arrière de sa tête et des aigrettes effilées descendent sur sa queue.

Sur la Réserve : toute l'année



Echasse blanche

Himantopus himantopus

Reconnaisable à son bec fin en aiguille et à ses pattes rouges extraordinairement longues, l'Echasse blanche se nourrit en pataugeant dans les eaux peu profondes, en surface desquelles elle recueille des insectes. Son corps est blanc et ses ailes entièrement noires.

Sur la Réserve : d'avril à octobre

Courlis cendré

Numenius arquata

Plus grand de tous les oiseaux limicoles, le Courlis cendré enfonce son long bec arqué (celui du mâle étant plus court que celui de la femelle) dans la vase pour y trouver sa nourriture. Son plumage est rayé, moucheté de gris brunâtre. Le nom de « Courlis » viendrait de son cri de contact, un sifflement sonore légèrement flûté : « kouuu(r)-li ».

Sur la Réserve: d'août à avril



Vanneau huppé

Vanellus vanellus

De la taille d'un pigeon, le Vanneau présente une huppe typique : noire (dans le prolongement de la calotte), fine et recourbée. Son dos est vert avec des reflets cuivrés et mauves. Appréciant la compagnie des Mouettes rieuses et des Pluviers, il exhibe en volant un fort contraste de noir et de blanc.

Sur la Réserve: d'août à mars



Barge à queue noire

Limosa limosa

Avec son long bec droit, la Barge à queue noire est un de nos plus grands limicoles. En vol, sa taille, les pattes qui dépassent de sa queue et une large barre blanche sur le dessus des ailes sont de bons indices pour l'identifier.

Sur la Réserve: de juillet à mai



Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Limicoles côtiers, les groupes de Pluviers argentés sont souvent observés sur les reposoirs émergés, aux côtés des Barges, Courlis et Chevaliers. Noir du bec à l'abdomen en plumage nuptial, ils se reconnaissent en vol à leurs aisselles noires caractéristiques.

Sur la Réserve: d'août à mai



Balbusard pêcheur

Pandion haliaetus

Rapace diurne, le Balbusard pêcheur capture ses poissons à la surface de l'eau en fondant sur eux en piquet. Capable de repérer une proie à plus de 100 mètres, il transporte en général son butin jusqu'à son nid ou un perchoir pour le consommer. Son dos brun foncé contraste avec le blanc net de sa poitrine, un bandeau noir sur l'œil lui donne parfois des airs de grand bandit masqué.

Sur la Réserve: d'août à avril



Bécassine des Marais

Gallinago gallinago

Long bec droit, tête rayée, dos brun foncé traversé de longues raies claires, la Bécassine des marais est aisée à identifier, à condition de la trouver ! Discrète, elle peut passer de longs moments à l'abri des touffes d'herbes ou des roseaux. En période nuptiale, elle plonge à vive allure vers le sol en déployant les plumes de sa queue pour produire un étonnant chevrottement.

Sur la Réserve: de septembre à avril




Chevalier arlequin

Tringa erythropus

Dynamique et élégant, le Chevalier arlequin est monté sur de longues pattes rouges en hiver et sombres en été. Son long bec fin est noir à rouge. Son plumage nuptial est d'un noir particulièrement sombre, moucheté de blanc sur le dessus. Attention à ne pas le confondre avec le Chevalier gambette qui a un bec plus court et des pattes rouges-orangées en toutes saisons.

Sur la Réserve: de juillet à avril



Canard souchet

Spatula clypeata

Un large bec et des iris jaunes sur une tête vert-bouteille : pas de doute, c'est un Canard souchet ! Son bec aplati sur les côtés lui permet de filtrer l'eau en l'aspirant et en la rejetant. Pour atteindre une nourriture un peu profonde, il est aussi capable d'immerger entièrement l'avant de son corps.

Sur la Réserve: de septembre à mai

Bécasseau variable

Calidris alpina

Le Bécasseau variable se reconnaît en plumage nuptial à la plage noire qu'il porte sur le haut du ventre. Grégaire en hiver, l'espèce peut former de très importants rassemblements. Sur la Réserve, on peut alors assister à des vols spectaculaires.

Sur la Réserve : de septembre à avril



Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

Petit limicole, le Grand Gravelot se reconnaît en vol à la barre alaire blanche qui borde le dessus de ses ailes. En plumage nuptial son bec est orange à bout noir, ses pattes sont oranges et l'oiseau porte un masque et un collier noirs bien marqués. Son bec devient noir en plumage inter-nuptial.

Sur la Réserve : de juillet à mai



Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Echassier trapu et court sur pattes, le Bihoreau gris est surtout actif à l'aube et au crépuscule où il pêche au bord de l'eau. L'adulte a la calotte et le dos noirs, l'iris de son œil est rouge vif. Les juvéniles arborent un plumage brun, leur poitrine est striée et l'iris de leur œil est jaune.

Sur la Réserve : d'août à mai



Spatule blanche

Platalea leucorodia

Nichant en colonies, la Spatule blanche est souvent observée en groupe. Elle doit son nom à son bec spatulé (noir à bout jaune chez l'adulte), qu'elle immerge complètement et balance de droite à gauche en avançant dans l'eau pour trouver sa nourriture. On dit qu'elle « sabre » l'eau.

Sur la Réserve : d'août à avril



Foulque macroule

Fulica atra

Appartenant à la même famille que la Gallinule poule d'eau (rallidés), la Foulque macroule se reconnaît au contraste frappant entre son plumage noir et son bec blanc surmonté d'une imposante plaque frontale. Ses fortes pattes se terminent par des doigts lobés facilitant la nage et la marche dans la végétation des marais.

Sur la Réserve : de juillet à mai




Goéland leucophée

Larus michahellis

Robuste, le Goéland leucophée (littéralement "tête blanche") niche en France le long des côtes maritimes (Atlantique et Méditerranée). On le reconnaît à ses pattes jaune vif, son œil jaune pâle au cercle orbitaire rouge et à son grand bec costaud.

Sur la Réserve : toute l'année



Canard pilet

Anas acuta

Svelte et élancé, le Canard pilet est souvent décrit comme le plus élégant de tous les canards. Sa tête brune fait ressortir le blanc de sa poitrine, qui remonte jusqu'à l'arrière de ses joues. Pour parfaire sa fière allure, le mâle arbore une longue queue noire effilée.

Sur la Réserve : de juillet à mai



Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Plus petite que la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière est représentée en Europe par plusieurs sous espèces. En France, la plus commune est la Bergeronnette printanière type : *Motacilla flava flava*. Le dessous de son corps est jaune vif, son dos est vert et sa queue noire est bordée de blanc.

Sur la Réserve : d'avril à octobre

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

La Gorgebleue construit chaque printemps son nid au sol, dans une touffe d'herbe. Le mâle parade en chantant depuis un perchoir. La gorge et la poitrine de la femelle sont blanchâtres, traversées par une bande de taches noires. Mâle et femelle présentent tous deux un très net sourcil pâle. Tout dérangement pouvant empêcher sa reproduction, ne l'observez pas trop longtemps et pensez à garder vos distances.

Sur la Réserve: de mars à octobre



Milan noir

Milvus migrans

Rapace opportuniste, le Milan noir est moins contrasté que le Milan royal. Il se reconnaît en vol par sa queue un peu fourchue, ses ailes arquées et 6 doigts noir au bout des ailes. Migrateurs, les Milans noirs commencent à quitter l'Europe dès le mois de juillet pour rejoindre leurs quartiers d'hiver, en Afrique subsaharienne.

Sur la Réserve: de mars à août



Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Petit oiseau vif et coloré, le Martin-pêcheur d'Europe doit son surnom de « flèche bleue » à son vol à pleine vitesse quelques centimètres au-dessus de l'eau. Repérable à son cri particulièrement aigu, il pêche en plongeant depuis un vol stationnaire ou un perchoir. Contrairement au mâle, la base inférieure du bec de la femelle est orange (de la même couleur que ses pattes).

Sur la Réserve: toute l'année



Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Toute de noir et de blanc vêtue, l'Avocette élégante balaie l'eau de son bec si caractéristique : un long bec noir fin et retroussé.

Dotée de jolies pattes gris-bleues, elle apprécie l'eau salée peu profonde, avec de la vase et des îlots.

Sur la Réserve: toute l'année



Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Passereau à l'allure proche d'une Fauvette, l'Hypolaïs polyglotte se laisse aisément observer au printemps, où il peut chanter de longs moments depuis un perchoir. Verdâtre sur le dessus, sa poitrine et sa gorge sont jaunes et son œil sombre. Son nom vient de sa capacité à imiter d'autres espèces : son chant peut inclure des imitations de Moineaux, Hirondelles, Merles ...

Sur la Réserve: d'avril à septembre




Pic épeiche

Dendrocopos major

Acrobate, le Pic épeiche passe beaucoup de temps accroché aux arbres en appui sur sa queue. Son tambourinage se fait plus présent au début du printemps. Le mâle se distingue de la femelle par la tâche rouge qui vient décorer sa nuque.

Sur la Réserve: toute l'année



Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

Aisément reconnaissable à son bec à tubercule rouge, le Tadorne de Belon a la tête noire et le corps blanc, cerclé d'une large bande pectorale rousse. Se nourrissant d'ordinaire en eau peu profonde et dans la vase, il lui arrive parfois de rechercher des insectes dans les prés ou les champs.

Sur la Réserve: toute l'année



Huppe fasciée

Upupa epops

Les Huppes observables chez nous passent l'hiver en Afrique et sont de retour à partir du mois de mars. En vol : cherchez un plumage chamois, des ailes noires et blanches, un long bec fin et un vol papillonnant. Sur la Réserve, tendez l'oreille pour repérer le chant caractéristique du mâle.

Sur la Réserve: de mars à septembre