



Journée Mondiale du MOINEAU



www.worldsparrowday.org

Organisée par la Nature Forever Society, la Journée Mondiale du Moineau est une initiative de sensibilisation aux menaces qui pèsent sur les populations de moineaux à travers le monde.



Des populations en déclin accéléré

Partout en Europe, les enquêtes ont confirmé le déclin des populations de Moineaux domestiques :

- 50% en 30 ans à Hambourg,
- 60% en 20 ans à Prague,
- 60% en 25 ans en Finlande,
- 62% en 30 ans en Grande-Bretagne ...

En France

Une enquête lancée en 2003 par le Centre Ornithologique Ile-de-France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux a conclu qu'entre 2003 et 2016, la chute des effectifs dans Paris était de l'ordre de 73%. Autrement dit : **trois moineaux sur quatre ont disparu du paysage parisien en moins de 15 ans !**

Les Moineaux friquets, plus ruraux que les Moineaux domestiques, empruntent une trajectoire encore plus brutale avec une perte de 80 à 95% des effectifs entre 1970 et 2000.

Plusieurs hypothèses ont été dégagées pour expliquer ce déclin massif, avec des facteurs variables selon les régions :

Raréfaction des sites de nidification

La construction de bâtiments aux façades lisses ne favorise pas la biodiversité et ne permet pas aux moineaux de pouvoir y nicher.

Suppression des cavités de nidification

Lors de la rénovation des bâtiments plus anciens (en général pour favoriser l'isolation thermique).

Disparition des insectes

Manque protéique lors du nourrissage des jeunes, crucial pour leur survie.

Prédation

Notamment par les chats domestiques (responsables au Royaume-Uni de 30 % de la mortalité des Moineaux).




Le plumage de la **femelle Moineau domestique** est brun/beige, plus uni que celui du mâle. Elle arbore un trait sourcilier clair.

Le Moineau domestique

Passer domesticus

Granivore (millet, blé, avoine), le Moineau domestique devient insectivore en période de reproduction. En ville, il est opportuniste et mange ce qu'il trouve. Cavernicole, il niche en colonies dans les anfractuosités des bâtiments. L'espèce s'est, au fil des millénaires, rapprochée de l'Homme qui de part son mode de vie lui fournit des sites de nidification et une alimentation relativement facile d'accès.

Espèce protégée en France par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009, le Moineau domestique fait désormais l'objet de diverses enquêtes. La destruction des nids, des œufs, des adultes ou des juvéniles étant interdite, une dérogation est absolument nécessaire pour retirer des nids.



Comment aider le Moineau domestique ?

Préserver les colonies existantes

Effectuer ses travaux en dehors de la période de reproduction et conserver les cavités des bâtiments lors de rénovations.

Etendre les colonies

Sédentaire et peu mobile, l'espèce a besoin de nichoirs spécifiques. Pour pallier à la raréfaction de sites de nidification, placer à proximité d'un endroit déjà fréquenté par des Moineaux un nichoir composé de cavités indépendantes (ou plusieurs nichoirs proches les uns des autres).

Fournir les ressources nécessaires à leur survie

Des graines en hiver, de la végétation à proximité des nids (pour s'alimenter et se dissimuler), des sols naturels pour l'entretien du plumage, de l'eau ...

Signaler ses observations

Signaler la présence de Moineaux permet aux organismes de protection de rassembler les données utiles à leur préservation.



Une [enquête lancée en 2024](#) par la LPO devrait faire état des populations de Moineaux encore présentes dans la capitale française.

En Nouvelle-Aquitaine, il est possible de signaler les oiseaux observés (signalements les plus détaillés possibles) sur la plateforme de l'[Observatoire Fauna](#), sur le site [Faune Nouvelle-Aquitaine](#) ou via l'application Naturalist.





Le Moineau friquet

Passer montanus

Plus rare et plus discret que le Moineau domestique, le Moineau friquet apprécie aussi la proximité avec l'Homme. On le trouve plutôt en zone rurale, où l'artificialisation a un impact considérable sur ses populations. Fréquentant les haies, les vieux vergers et les lisières de forêt, il se nourrit principalement de graines et d'insectes (dont coccinelles).

Chez les Moineaux friquets, mâles et femelles se ressemblent mais le mâle présente des teintes légèrement plus prononcées que la femelle.

Tout comme le Moineau domestique, **il est possible de l'observer dans la Réserve Ornithologique du Teich** où il trouve les ressources nécessaires à sa nidification.

Espèce particulièrement menacée, la population française de Moineau friquet **a diminuée de 60% entre 2010 et 2020.**



Autres Passéridés de France métropolitaine

Dans la Réserve Ornithologique du Teich, il est arrivé d'observer le **Moineau soulcie** (*Petroniapedronia*), un Moineau à bec jaune qui affectionne les milieux rocailleux et arbore à la base de la gorge une jolie tache jaune :



© Jacques Gillon

Ailleurs en France, il est également possible d'observer le **Moineau cisalpin** (*Passer italiae*) ou le **Moineau espagnol** (*Passer hispaniolensis*), sans oublier la **Niverolle alpine** (*Montifringilla nivalis*) qui appartient aussi à la famille des passéridés.

©Erick Laucher



Rue du port
33470 LE TEICH
05 24 73 37 33

www.reserve-ornithologique-du-teich.com