



#WorldCurlewDay

Journée mondiale DU COURLIS



21 avril



Créée en 2017 par Mary Colwell (présidente en Angleterre du Curlew Recovery Partnership), la **Journée Mondiale du Courlis** (World Curlew Day) célèbre le **21 avril** les Courlis et les initiatives prises à travers le monde pour la protection et la conservation de leurs populations.

Sur 9 espèces de courlis décrites dans le monde,
2 ont cessé d'exister en moins de 40 ans.

Le **Courlis esquimau** (*Numenius borealis*) n'a plus été observé depuis 1987.

Une étude publiée en novembre 2024 estime à 96% la probabilité que son cousin, le **Courlis à bec grêle**, soit désormais éteint. C'est la première fois, depuis l'existence des suivis naturalistes, qu'une espèce est déclarée éteinte dans le Paléarctique occidental.



Courlis esquimau

Numenius borealis

© TBRC Accepted Records

25 mars 1962

1962 Eskimo Curlew location, Galveston,
Texas, United States

Source : [eBird.org](https://ebird.org)



Courlis à bec grêle

Numenius tenuirostris

© Andy Butler

26 janv. 1994

Moulay Bousselham- marsh,
Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Morocco

Source : [eBird.org](https://ebird.org)

Pourquoi un tel déclin ?

- **Dégradation et fragmentation des habitats**

L'urbanisation, l'intensification agricole, le drainage et la disparition des zones humides réduisent les espaces favorables à la reproduction du Courlis cendré. Autrefois présent dans les tourbières et prairies inondables, le Courlis avait trouvé refuge dans les prairies humides créées par l'homme. Mais depuis le milieu du XXe siècle, l'intensification agricole et le morcellement des paysages ont inversé cette dynamique.

- **Intensification des pratiques agricoles**

Des fauches de plus en plus précoces entraînent la destruction des nids. La fertilisation des prairies modifie la végétation, qui devient à la fois trop dense pour les poussins et trop pauvre en termes de ressources alimentaires. Dans les Landes, les travaux forestiers (broyage notamment) peuvent également affecter les populations locales.

- **Pression de prédation**

Malgré un plumage cryptique, le Courlis cendré niche au sol et ses œufs comme ses poussins n'échappent pas toujours aux prédateurs.

- **Sensibilité au dérangement**

Le Courlis est particulièrement vulnérable pendant la période de reproduction, où des perturbations répétées peuvent entraîner l'abandon du nid.

- **Pression de chasse**

Longtemps chassé, le Courlis cendré a fait l'objet d'un arrêté suspendant sa chasse sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2025. L'espèce est au cœur d'un plan d'action international adopté par plus de 20 pays signataires de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), dans lequel la France est légalement engagée. La prolongation du moratoire suspendant la chasse du Courlis cendré comme de la Barge à queue noire pour les années suivantes n'est, pour autant, pas assurée.

Courlis cendré

Numenius arquata

« **Quasi menacé** » sur la Liste rouge mondiale de l'UICN, le Courlis cendré est considéré comme « **Vulnérable** » en France métropolitaine. Ces statuts reflètent le déclin significatif de l'espèce, dont les **populations françaises ont diminué de 68% depuis 2001**.

En France, le Courlis cendré niche dans la moitié nord du pays, où **l'espèce a disparu d'une grande partie de ses aires historiques de reproduction** (moins de 1500 couples). Dans notre région, le Bassin d'Arcachon est son principal quartier d'hivernage. Il joue un rôle de refuge climatique pour les Courlis qui s'y réfugient pendant les vagues de froid d'Europe de l'Ouest, les pays nordiques et les îles Britanniques accueillant les populations européennes les plus importantes.

S'il fréquente les milieux ouverts (landes, marais, prairies humides...) en période de reproduction, le Courlis cendré se tourne en hiver vers les vasières et les hauts de plages du littoral, où il forme des dortoirs.



Plus grand de tous les oiseaux limicoles, le Courlis cendré enfonce son long bec arqué dans la vase pour y trouver sa nourriture. Son plumage est rayé, tacheté de gris brunâtre. Le nom de « Courlis » viendrait de son cri de contact, un sifflement sonore légèrement flûté : « kouuu(r)-li ».

Dans la Réserve, qui accueille 800 à 1000 courlis cendrés en hiver, il est possible de l'observer du mois d'août au mois d'avril.

Courlis cendré

Numenius arquata



Ne pas confondre avec :

Courlis corlieu

Numenius phaeopus



Plus petit que le Courlis cendré, le Courlis corlieu présente un bec plus court. Un trait foncé vient souligner son sourcil pâle. De face, une nette bande centrale pâle se dessine sur sa calotte. L'espèce niche principalement dans les grandes tourbières de la taïga et de la toundra. Les oiseaux de la population européenne hivernent en Afrique de l'Ouest. Ils se rassemblent au printemps sur plusieurs zones de halte migratoire, principalement aux Pays-Bas, en France et en Hongrie.

Études & programmes de sauvegarde

“ Le Courlis cendré est **de retour sur les zones incendiées**. Des espèces emblématiques ont été observées dans le cadre des suivis biodiversité engagés suite aux incendies de Landiras, en 2022.

Le Courlis cendré niche au sol, aussi, la LPO et le PNR proposent de travailler conjointement avec les forestiers pour leur **indiquer la présence des nids** afin d'éviter toute destruction involontaire lors d'interventions sur les parcelles. ”

[Parc naturel régional des Landes de Gascogne](#)

“ La région Nouvelle-Aquitaine hébergerait près de **10% de la population nationale de Courlis cendré nicheuse**. Programme de sauvegarde, le **projet Co-Courlis Nouvelle-Aquitaine** regroupe un consortium de cinq associations sur huit départements, pour améliorer les connaissances sur la biologie et l'écologie de l'espèce, mettre en place des mesures de protection et de conservation et sensibiliser les acteurs du territoire. La SEPANSO Aquitaine coordonne le programme en Gironde et dans les Landes, où l'espèce niche souvent en contexte sylvicole. ”

[SEPANSO, Sud-Ouest Nature](#)

“ En avril 2023, des scientifiques de l'établissement public territorial de bassin Saône-Doubs capturent un couple de courlis cendré et leur posent une balise GPS en Haute-Saône. Les chercheurs ont découvert que **les courlis cendrés passent l'hiver séparés de 200 km** et reviennent ensemble pour la nidification. ”

[EPTB Saône et Doubs - Science&Vie](#)

“Oiseau emblématique, **le courlis cendré disparaît d’Alsace...** et lui préfère l’Allemagne. Il est aux rieds alsaciens ce que le grand tétras est au massif vosgien. Oiseau des prairies humides, le courlis cendré vit peut-être sa **dernière année de présence en Alsace**. Tandis qu’outre-Rhin, ses populations se portent plutôt bien.”

Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace - L’Alsace

“De retour dans les monts d’Arrée (Finistère), le Courlis cendré fait l’objet d’une protection accrue. La situation y est plus que préoccupante : **seuls six couples ont été recensés en 2024**, alors qu’on en comptait 90 dans les années 1980. Face à cette urgence, le Parc naturel régional d’Armorique, avec le soutien de l’Europe, de la Région Bretagne et du Département du Finistère mène différentes actions à travers le programme LIFE Landes.”

Parc naturel régional d’Armorique

“Les limicoles font partie des **espèces les plus menacées d’Irlande** : six des huit espèces régulières sur le territoire sont placées en liste rouge et les populations de Courlis cendrés et de Vanneaux huppés se sont effondrées de 90% ces vingt dernières années. Perte d’habitat et prédation impactent aujourd’hui encore les populations restantes. Autrefois emblématiques des terres britanniques tant ils étaient nombreux, les Courlis cendrés se reproduisent de mi-avril à mi-juillet dans les tourbières, les prairies humides et les pâturages.”

Programme de conservation des Courlis en Irlande



PHOTOS

Erick LAUCHER

Guy DAVID

Jacques GILLON



Rue du port
33470 LE TEICH

05 24 73 37 33

www.reserve-ornithologique-du-teich.com